

## میکروب پنوموکوک سبب چه بیماری هایی می شود؟

موجب بیماری هایی مانند سینوزیت (التهاب در بافت پوششی سینوس ها)، منژیت (عفونت پرده های مجرز)، عفونت گوش میانی، پنومونی (سینه پهلویا ذات الریه) و عفونت خون می شود، ممکن است منجر به بستری شدن کودک در یمارستان، ایجاد عوارض در کودک یا مرگ شود.

## عفونت پنوموکوک چگونه گسترش می یابد؟

عفونت پنوموکوکی از طریق قطرات تنفسی در حین صحبت کردن و تماس نزدیک یعن افراد منتقل می شود. بیماری از طریق فرد بیمار، ناقل سالم (فردی که آنوده به میکروب است اما علائم بیماری ندارد) و همچنین اشیاء آلوده شده با ترشحات بدن قابل انتشار است.

## چه کسی بیشتر در معرض ابتلاء به عفونت پنوموکوکی است؟

کودکان زیر ۵ سال و به خصوص زیر ۲ سال، نوزادان، کودکان مبتلا به نقص سیستم ایمنی، سوء تغذیه، عدم دریافت شیر مادر، قرار گرفتن در معرض دود و سیگار و زندگی در شهرهای صنعتی و پر ازدحام.

## برنامه جدید ایمن سازی در ایران

واکسن پنوموکوک به شکل تزریقی در سن ۲ و ۴ و ۱۳ ماهگی، همزمان با سایر واکسن های همان گروه سنی، مطابق جدول زیر تجویز می شود:

برنامه	نوع واکسن
بدو تولد	هپاتیت ب، فلج اطفال خوارکی، بثژ
۲ ماهگی	فلج اطفال خوارکی، بنج گانه (سه گانه + هپاتیت ب + هموفیلوس آفلو اور) پنوموکوک، روتا و بیروس
۴ ماهگی	فلج اطفال خوارکی، فلح اطفال تزریقی، تزریقی، بنج گانه، پنوموکوک، روتا و بیروس
۶ ماهگی	فلج اطفال خوارکی، فلح اطفال تزریقی، بنج گانه، روتا و بیروس
۱۲ ماهگی	واکسن سرخک، سرخچه، اوریون (MMR)
۱۸ ماهگی	فلج اطفال خوارکی، MMR، سه گانه (دیفتری، کزان سیاه سرفه)
۶ سالگی	فلج اطفال خوارکی، سه گانه

هرگز ایلان  
هزارت پرداخت داران آغاز نمایند  
همراهان با چهل هزار نسل توسعه زبانه و انسانسازیون کشور  
کامی دیگر برای افزایی سلامت کودکان

## رودو واکسن پنوموکوک

به برنامه ایمن سازی کودکان



# با واکسن پنوموکوک ایمن تر و سالم تر



## راهنمای والدین



- نارس بودن شیرخواریا وزن کم هنگام تولد
- تماس خانگی با خانم پادر
- سابقه حساسیت خفیف در دریافت کننده واکسن یا بستگان وی
- تغذیه با شیر مادر
- سوء تغذیه
- ابتلا به زردی دوره نوزادی
- سابقه سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار در خانواده
- تماس خانگی با فرد دچار نقص ایندیک
- سابقه جراحی اخیر یا جراحی در آینده نزدیک
- بیماری‌های مزمم غیر و اگر قلی، ریوی، کلیوی، کبدی و متابولیک (مانند دیابت)
- بیماری‌ها و شرایط پایدار و غیر پیش رونده عصبی مانند سندرم داون و فلج مغزی
- سابقه تشنج در خانواده
- سابقه خانوادگی پیامد نامطلوب ایمن‌سازی
- دریافت اخیر فراورده‌های خونی یا کاماتلوبولین

**همیشه واکسن نزدن و یا به تعویق انداختن بدون دلیل آن اشتباه است.**

می‌گیرد، بانام تجاری پنوموسیل و دارای تاییدیه سازمان جهانی بهداشت است. این واکسن در حال حاضر در بسیاری کشورها برای واکسیناسیون کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**آیا واکسن پنوموسیل قبل تجویز است؟**  
بله؛ واکسن پنوموسیل در این کودکان همانند سایر کودکان قابل استفاده و مفید است.  
در صورتی که نتوانستید کودک خود را به موقع برای واکسیناسیون ببرید، در اولین فرصت، او را به مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه یا خانه بهداشت ببرید.

### برخی باورهای نادرست در مورد واکسیناسیون

هیچ یک از نگرانی‌های زیر، دلیل درستی برای واکسن نزدن یا به تعویق انداختن آن نیست:

- مواجهه اخیر با یک بیماری عفونی
- بیماری خفیف با تب مختصراً مانند سرماخوردگی، عفونت گوش و اسهال خفیف
- بودن در دوره نقاوت یک بیماری
- دریافت آنتی بیوتیک یا داروهای ضد ویروس

### چند نوبت واکسن پنوموسیل و درجه سی تزریق می‌شود؟

سه نوبت باید دریافت شود. نوبت اول در ۲ ماهگی و دومین و سومین نوبت آن به ترتیب در ۴ و ۱۲ ماهگی تجویز می‌شود.

### توصیه‌های معمول بعد از تزریق واکسن پنوموسیل چیست؟

پس از واکسیناسیون، تب مختصر، درد، تورم، سفتی در محل تزریق بی‌قراری و تحریک پذیری کودک، شایع است: اما جای نگرانی نیست. در صورتی که در محل تزریق واکسن، تورم و قرمزی وجود دارد، برای کاهش آن، یک پارچه سرد، مرتبط و تمیز روی محل تزریق فرازدهید. در صورت بروز تب، درد یا بی‌قراری، با کارکنان بهداشتی در مرکز جامع سلامت، پایگاه یا خانه بهداشت مشورت کنید. پس از واکسیناسیون، از پوشاندن لباس تنگ‌به کودک که موجب فشار آمدن به محل تزریق می‌شود، خودداری کنید. شستن محل تزریق واکسن واستحمام کودک پس از واکسیناسیون منع ندارد.

### واکسن پنوموسیل به چه اشکالی در دسترس است؟

واکسن پنوموسیل که در برنامه جاری ایمن‌سازی کودکان مورد استفاده قرار